

CATALOGUE DES OISEAUX DU DAHOMÉY REMIS PAR M. MIEGEMARQUE
AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE, EN 1895,

PAR E. OUSTALET.

M. Miegemarque a remis au Muséum, au retour d'un voyage au Dahoméy, une collection d'Oiseaux qui présente un réel intérêt, la faune ornithologique de ce pays n'étant guère connue que par une courte note publiée en 1887 par M. J. A. de Souza ⁽¹⁾. J'ai donc cru utile, en attendant que je puisse faire paraître un travail plus complet sur les Oiseaux de notre colonie, de donner la liste des Oiseaux rapportés par M. Miegemarque, en notant d'un astérisque les espèces envoyées précédemment au Muséum de Lisbonne par M. Francisco Newton et signalées par M. de Souza.

1. ELANUS COERULEUS Desf.

Mâle; n° 10 cat. voy.; 20 janvier 1895; environs de Porto-Novo.

2. BARBATULA SCOLOPACEA Tem.

Mâle; n° 50 cat. voy.; 11 février 1895; Adjara.

3. PICUS (MESOPICUS) GOERTAN Müll.

Mâle; n° 27 cat. voy.; 20 janvier 1895; Porto-Novo.

Mâle; n° 35 cat. voy.; 4 février 1895; Porto-Novo.

4. COCCYSTES CAFER Licht.

Mâle; n° 20 cat. voy.; 21 janvier 1895; Porto-Novo.

— n° 5 cat. voy.; 11 février 1895; Adjara.

* 5. CHRYSOCOCCYX CUPREUS Bodd.

Femelle; n° 17 cat. voy.; 27 janvier 1895; Bopa.

6. CENTROPUS MONACHUS Rüpp.

Mâle; n° 21 cat. voy.; 25 janvier 1895; Porto-Novo.

Mâle; n° 31 cat. voy.; 24 janvier 1895; Bopa.

* 7. CENTROPUS SENEGALENSIS L.

Mâle; n° 19 cat. voy.; 21 janvier 1895; Porto-Novo.

* 8. ISPIDINA PICTA Bodd.

Mâle; n° 33 cat. voy.; 27 janvier 1895; Porto-Novo.

* 9. MEROPS MALIMBICUS Shaw.

Merops bicolor (Daud.) Souza, *op. cit.*, n° 2.

Mâle; n° 11 cat. voy.; 30 janvier 1895; Porto-Novo.

(1) *Aves de Dahomey*, Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes. Lisboa, 1887, n° XLIV.

10. *MEROPS ALBICOLLIS* V.

Mâle; n° 5 cat. voy.; 25 janvier 1895; environs de Porto-Novo.

11. *SCOTORNIS CLIMACURUS* V.

Mâle; n° 22 cat. voy.; 20 janvier 1895; environs de Porto-Novo. Individu à teintes rousses très accentuées.

12. *CINNYRIS CYANOLEMA* Jard.

Femelle; n° 40 cat. voy.; 9 février 1895; Adjacin.

13. *TURDUS PELIOS* Bp.

Femelle; n° 13 cat. voy.; 30 janvier 1895; Bécon.

14. *MOTACILLA VIDUA* Sund.

Femelle et jeune; n°s 54 et 55 cat. voy.; 4 et 11 février 1895; Adjara.

15. *PYCNOTUS BARBATUS* Desf.

Mâles et femelles; n°s 1, 2, 6 et 41 cat. voy.; 23 et 25 janvier et 7 février 1895; environs de Porto-Novo.

16. *XENOCICHLA FLAVICOLLIS* Sw.

Mâle; n° 16 cat. voy.; 22 janvier 1895; Bopa.

17. *LANIUS COLLARIS* VAR. *SMITHI* Fras.

N°s 7 et 18 cat. voy.; 21 et 25 janvier 1895; environs de Porto-Novo.

18. *LANIUS RUFUS* Briss.

Mâles; n°s 14 et 15 cat. voy.; 30 janvier 1895; Bécon.

19. *TELEPHONUS SENEGALUS* L.

Femelle; n° 40 cat. voy.; 7 février 1895; région de Porto-Novo.

20. *HYPHANTORNIS CUCULLATUS* Müll.

Mâle; n° 3 cat. voy.; 23 janvier 1895; région de Porto-Novo.

21. *CINNAMOPTERYX CASTANEOFUSCA* Less.

Mâle; n° 23; 20 janvier 1895; région de Porto-Novo.

22. *TURTUR SENEGALENSIS* L.

Mâle; n° 12 cat. voy.; 30 janvier 1895; environ de Bécon.

23. *CHALCOPELIA AFRA* L.

Mâle; n° 39 cat. voy.; 7 février 1895; région de Porto-Novo.

24. *LIMNOCORAX NIGER* Gm.

Mâles; n°s 25 et 26 cat. voy.; 24 janvier 1896; lagune de Bopa.

25. *GREGOPSIS EGREGIA* Peters.

Mâle; n° 44 cat. voy.; 8 février 1895; Adjacin.

26. *PARRA AFRICANA* Gm.

Mâles et femelles; n°s 9, 24, 28 et 29 cat. voy.; lagune de Porto-Novo.

Femelle; n° 39 cat. voy.; lagune de Bopa.

27. *ARDEA PURPUREA* L.

Femelle; n° 49 cat. voy.; 4 février 1895; Adjara.

28. *ARDETTA PODICEPS* Bp.

Femelle; n° 8 cat. voy.; 26 janvier 1895; lagune de Porto-Novo.

A ces espèces que le Muséum a reçues de M. Miegemarque, il convient d'ajouter les suivantes, rapportées l'année précédente au même établissement par M. Dybowski :

29. (7 *bis*). *HALCYON SENEGALENSIS* L.

30. (12 *bis*). *CARMELITA FULIGINOSA* Shaw.

31. (21 *bis*). *TRERON CALVA* Tem.

32. (27 *bis*). *ARDEA ATRICAPILLA* Afz.

33. (27 *ter*). *ARDEOLA RALLOIDES* Scop.

Enfin il est un certain nombre d'Oiseaux dont M. Miegemarque et M. Dybowski n'ont pu obtenir des spécimens, mais qui avaient été recueillis dans le Dahomey par d'autres voyageurs.

Tels sont :

1° ESPÈCES OBTENUES PAR F. NEWTON.

34. (1 *bis*). *POGONORHYNCHUS BIDENTATUS* Shaw.

35. (10 *bis*). *EURYSTOMUS AFER* Lath.

36. (10 *ter*). *TOCKUS NASUTUS* L.

37. (12 *ter*). *IRRISOR ERYTHORHYNCHUS* Lath.

38. (14 *bis*). *COSSYPHA VERTICALIS* Harth.

39. (16 *ter*). *MELANORNIS EDOLIOIDES* Sw.

40. (18 *bis*). *LANIARUS BARBARUS* V.

41. (19 *bis*). *CORVINELLA CORVINA* Staw.

42. (19 *ter*). *LAMPROCOLIUS AURATUS* Gm.

43. (19 *quater*). *CORVUS SCAPULATUS* Daud.

44. (19 *quinquies*). *HYPHANTORNIS TEXTOR* Gm.

45. (27 *ter*). *ARDEA (BUBULCUS) IBIS* Hasselq.

2° ESPÈCES OBTENUES PAR FRASER ⁽¹⁾.

46. (7 *bis*). *HALCYON CHELICUTENSIS* Sharpe.

H. striolata (Gr.), Hartlaub, *Syst. Orn. W. Afr.*, 1857, p. 31, n° 83.

47. (13 *bis*). *DRYMOECA STRANGEI* Fras.

D. fortirostris (Jard.), Hartlaub, *op. cit.*, p. 56, n° 163.

(1) D'après Hartlaub, *Syst. Orn. W. Afr.*, 1857.

47. (13 *ter*). *PRINIA MYSTACEA* Rüpp.

Drymeca mystacea Rüpp., Hartlaub, *op. cit.*, p. 59, n° 166.

48. (16 *bis*). *HIRUNDO GORDONI* Jard., Hartlaub, *op. cit.*, p. 27, n° 74.

Ce chiffre de 48 espèces, dont la présence a été constatée au Dahomey par les voyageurs que je viens de citer, ne représente certainement pas le nombre total des formes ornithologiques qui existent dans notre colonie. Il s'accroîtra évidemment par de nouvelles recherches.

OBSERVATIONS BIOLOGIQUES SUR LES HYMÉNOPTÈRES DES FORÊTS,

PAR M. L. G. SEURAT.

(LABORATOIRES DE MM. LES PROFESSEURS MILNE EDWARDS ET BOUVIER.)

Vers le commencement de l'année dernière, mon attention fut attirée par la présence, dans le laboratoire même des Hautes Études, de nombreux individus d'un Coléoptère longicorne d'un beau rouge, le *Callidium sanguineum*, Linné; ces Insectes étaient éclos dans le bûcher renfermant le bois de Chêne employé pour le chauffage; les larves vivent à l'intérieur du bois, où elles creusent de nombreuses galeries, ne se rapprochant de la surface qu'à la fin de la vie larvaire, et venant alors se nymphoser dans une petite chambre ménagée par elles entre l'écorce et le bois; à l'éclosion, l'adulte perce l'écorce et sort; le trou de sortie est oblique par rapport à l'écorce, à contour externe ovale, de 4 millimètres de grand axe sur 2 millimètres $1/2$ de petit axe; si l'on examine les chambres où se nymphosent les larves du *Callidium sanguineum*, on se rend compte immédiatement de l'existence des ennemis de ce Coléoptère; dans beaucoup de cas, on trouve en effet la dépouille de la larve, c'est-à-dire la peau, les mandibules et les trachées, et à côté, un certain nombre de cocons jaune-pâle, contenant chacun une petite larve; ces cocons, à l'éclosion, donnent un petit Hyménoptère appartenant à la famille des Braconides, le *Doryctes gallicus* Rheinhard; le *Doryctes gallicus* est naturellement très abondant au laboratoire, et l'existence de matériaux d'études aussi faciles à se procurer à n'importe quelle époque de l'année, dans un endroit bien déterminé (les bûches de Chêne), où on est toujours sûr d'en trouver, nous a immédiatement décidé à choisir cet Insecte parmi les nombreux représentants de la famille des Braconides, pour effectuer nos recherches sur l'anatomie, les mœurs et le développement post-embryonnaire des Hyménoptères entomophages. — Le Conseil municipal de Paris a bien voulu, sur la proposition des mes maîtres, MM. les professeurs Milne Edwards et Bouvier, s'intéresser à ces